



睛可平®

# 复方醋酸钠林格注射液

说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

**警示语:** 使用前请认真检查,如存在药液浑浊或有异物,袋体破损或渗漏情况切勿使用。

**【药品名称】**

通用名称: 复方醋酸钠林格注射液

英文名称: Compound Sodium Acetate Ringer's Injection

汉语拼音: Fufang Cusuanna Linge Zhushye

**【成 份】**

| 成份  | 250ml中 | 500ml中 |
|---|--------|--------|
| 氯化钠 (NaCl)  | 1.593g | 3.186g |
| 氯化钾 (KCl)   | 0.075g | 0.150g |
| 氯化镁 (MgCl <sub>2</sub> · 6H <sub>2</sub> O)   | 0.051g | 0.102g |
| 醋酸钠 (C <sub>2</sub> H <sub>3</sub> NaO <sub>2</sub> · 3H <sub>2</sub> O)                | 0.851g | 1.702g |
| 枸橼酸钠 (C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> Na <sub>3</sub> O <sub>7</sub> · 2H <sub>2</sub> O) | 0.147g | 0.294g |
| 葡萄糖酸钙 (C <sub>12</sub> H <sub>22</sub> CaO <sub>14</sub> · H <sub>2</sub> O)            | 0.168g | 0.336g |
| 葡萄糖 (C <sub>6</sub> H <sub>12</sub> O <sub>6</sub> )                                    | 2.500g | 5.000g |
| 热量  | 10kcal | 20kcal |

电解质浓度mEq/L

| Na <sup>+</sup> | K <sup>+</sup> | Mg <sup>2+</sup> | Ca <sup>2+</sup> | Cl <sup>-</sup> | 醋酸离子 | 葡萄糖酸离子 | 柠檬酸离子 |
|-----------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|------|--------|-------|
| 140             | 4              | 2                | 3                | 115             | 25   | 3      | 6     |

本品含有添加剂盐酸 (PH调节剂)

**【性 状】**

本品为无色的澄明液体。

**【适 应 症】**

用于循环血液量及组织液减少时的细胞外液的补充,代谢性酸中毒的纠正。

**【规 格】**

(1) 250ml; (2) 500ml

**【用法用量】**

用法: 静脉滴注, 输入速度通常为15ml/kg/h以下。

用量: 通常成人一次500~1000ml。

根据年龄、症状和体重不同适当增减。

**【不 良 反 应】**

据报道,总数201例患者中发现2例不良反应,不良反应发生率为1.0%。主要为心电图ST段降低,心律不齐。

大量或快速输液时,出现脑水肿、肺水肿、末梢水肿。

**【禁 忌】**

下列情况禁用:

1.高钾血症; 2.高钙血症; 3.高镁血症; 4.甲状腺机能低下。

## 【注意事项】

1.本品不以补充能量为目的，当患者的循环动态等达到稳定时，根据患者的状态进行调节，应该根据需要中止本品，改用维持输液或者高能量输液等。

### 2.下列情况慎用：

- (1) 肾功能不全者，因水、电解质调节机能低下，慎用本品。
- (2) 心功能不全患者，输入本品可引起循环血容量增多，心脏负担加重，可能会使症状加重，应慎重给药。
- (3) 高渗性脱水患者，由于本品含多种电解质，用后可能使症状加重，应慎用本品。
- (4) 阻塞性尿路疾患导致尿量减少患者，因水、电解质负荷过量，可能会使症状加重，应慎重给药。
- (5) 糖尿病患者，由于抑制葡萄糖向组织的移行，可能会导致高血糖症状恶化，应慎重给药。

### 3.给药前：

- (1) 输液时注意防止感染（患者皮肤和器具要消毒）。
- (2) 寒冷期间本品应温热至体温水平使用。
- (3) 本品开封后一次性使用，残留液体不得留作下次使用。

### 4.输液时：要观察血液循环状态和尿量，根据需要调整给药速度。

### 5.其他注意事项

一般药理试验中，本液按 $1\text{mg}/\text{kg}$ /分速度急速输入比格犬体内，输液后不久，因该液中含有醋酸钠，会引起一过性血压轻度降低，心电图R波电位降低和呼吸数增加。

## 【孕妇及哺乳期妇女用药】

尚不明确。

## 【儿童用药】

低出生体重儿、新生儿、乳儿、幼儿或小儿的安全性未确立(无使用经验)。

## 【老年用药】

高龄患者因心、肾机能和糖代谢等生理功能降低，输液时注意速度要缓慢或减量输液等。

## 【药物相互作用】

- 1.本品含钙离子，当与枸橼酸和血液混合时可引起凝血。
- 2.本品遇磷酸根离子和碳酸根离子会生成沉淀，因此不得与含有上述二离子的制剂配伍。
- 3.本品与头孢匹林钠盐、硫酸阿贝卡星和头孢他啶配合应用时，会使这些抗生素效价降低，故配制后3小时内用完。
- 4.本品与硫喷妥钠、坎利酸钾混合时，会有沉淀生成和结晶析出。

## 【药物过量】

尚未明确。

## 【药理毒理】

本品为多种电解质（含钠、钾、镁、钙离子）成分组成的复方制剂，用于体内水、电解质平衡的维持和补充。

## 【药代动力学】

尚未明确。

## 【贮藏】

密闭保存。

## 【包装】

三层共挤输液用膜（I）制袋包装。250ml/袋：40袋/箱；500ml/袋：20袋/箱。

## 【有效期】

12个月

## 【执行标准】YBH00542018

## 【批准文号】

- (1) 国药准字H20183076
- (2) 国药准字H20183077

## 【生产企业】

企业名称：南京正大天晴制药有限公司

生产地址：南京经济技术开发区惠欧路9号

邮政编码：210038

电话号码：025-85801888

传真号码：025-85803122

网    址：[www.njcttq.com](http://www.njcttq.com)